

Merci de lire cette fiche entièrement avant de recueillir les selles

Madame, Monsieur,

Votre médecin vous a prescrit une recherche de sang dans les selles. Le résultat de cet examen dépend du bon recueil que vous allez faire. Nous vous recommandons de suivre scrupuleusement les indications suivantes.

Aucune restriction alimentaire n'est nécessaire avant le recueil.

Pour les femmes



Les échantillons ne doivent pas être prélevés :

- pendant ou dans les 3 jours suivant les menstruations.
- si saignement hémorroïdaire ou urinaire.
- si abus d'alcool, prise d'aspirine ou d'anti-inflammatoires pouvant provoquer une irritation gastro-intestinale, 48 heures avant le test.

Pour les hommes



Les échantillons ne doivent pas être prélevés :

- si saignement hémorroïdaire ou urinaire.
- si abus d'alcool, prise d'aspirine ou d'anti-inflammatoires pouvant provoquer une irritation gastro-intestinale, 48 heures avant le test.

Recueil des selles :



1. Recueillir une partie des selles dans le flacon à bouchon rouge fourni par le laboratoire.



2. Prendre le tube de prélèvement et dévisser le bouchon carré blanc comportant une tige blanche



3. Piquer la tige blanche dans les selles à 5 endroits différents
AU MAXIMUM

**PIQUER DANS LES SELLES
SANS DEPASSER LE
DERNIER CRAN ICI**



4. Revisser le bouchon carré avec sa tige dans le tube de prélèvement



5. Mélanger vigoureusement le prélèvement

6. Indiquer votre Nom, Prénom et date de naissance sur l'étiquette, la coller sur le tube de prélèvement

7. Mettre le tube de prélèvement dans le sachet fourni par le laboratoire

8. Jeter le flacon à bouchon rouge contenant les selles

A conserver à température ambiante et à déposer au laboratoire impérativement dans les 24h

Merci de lire cette fiche entièrement avant de recueillir les selles

Madame, Monsieur,

Votre médecin vous a prescrit une recherche de sang dans les selles. Le résultat de cet examen dépend du bon recueil que vous allez faire. Nous vous recommandons de suivre scrupuleusement les indications suivantes.

Aucune restriction alimentaire n'est nécessaire avant le recueil.

Pour les femmes



Les échantillons ne doivent pas être prélevés :

- pendant ou dans les 3 jours suivant les menstruations.
- si saignement hémorroïdaire ou urinaire.
- si abus d'alcool, prise d'aspirine ou d'anti-inflammatoires pouvant provoquer une irritation gastro-intestinale, 48 heures avant le test.

Pour les hommes



Les échantillons ne doivent pas être prélevés :

- si saignement hémorroïdaire ou urinaire.
- si abus d'alcool, prise d'aspirine ou d'anti-inflammatoires pouvant provoquer une irritation gastro-intestinale, 48 heures avant le test.

Recueil des selles :



1. Recueillir une partie des selles dans le flacon à bouchon rouge fourni par le laboratoire.



2. Prendre le tube de prélèvement et dévisser le bouchon blanc comportant une tige blanche



3. Piquer la tige blanche dans les selles à 5 endroits différents
AU MAXIMUM

PIQUER DANS LES SELLES SANS DEPASSER LES RAINURES ICI



4. Revisser le bouchon avec sa tige dans le tube de prélèvement

5. Mélanger vigoureusement le prélèvement

6. Indiquer votre Nom, Prénom et date de naissance sur l'étiquette, la coller sur le tube de prélèvement

7. Mettre le tube de prélèvement dans le sachet fourni par le laboratoire

8. Jeter le flacon à bouchon rouge contenant les selles

A conserver à température ambiante et à déposer au laboratoire impérativement dans les 24h