



MERCI DE LIRE CETTE FICHE ENTIEREMENT AVANT LA REALISATION DU TEST

Madame, Monsieur,

Votre médecin vous a prescrit un test respiratoire à l'urée 13C. Le résultat de cet examen dépend du bon respect des consignes suivantes, que nous vous remercions de suivre scrupuleusement.

Ce test est contre indiqué pendant la grossesse et l'allaitement.

- Ce test doit être réalisé impérativement au laboratoire (le test se fait en 2 prélèvements avec un temps d'attente de 30 minutes entre les 2).
- Vous devez vous procurer en pharmacie le kit nécessaire au test (ordonnance de votre médecin).
- Pour les enfants de 3 à 11 ans, test Hélicobacter test INFAI. Vous procurer et amener au laboratoire 200ml de jus d'orange pur.
- Respecter, avant la réalisation du test au laboratoire les précautions suivantes:

1. Arrêter la prise des médicaments suivants :

Au moins 4 semaines avant le test	2 semaines avant le test	24 heures avant le test
<i>Arrêt de tout traitement antibiotique.</i>	<i>Arrêt des traitements anti- sécrétoires*</i> IPP Inexium, Lanzor, Ogast, Mopral, Omeprazole, Zoltum, Eupantol, □ Inipomp, Pariet Anti-H2 Stomedine, Tagamet, Pepsidac, Pepdine, Nizaxid, Azantac, Raniplex, Pepcidduo Et aussi Cytotec, Keal, Ulcar	<i>Arrêt des traitements antiacides et pansements gastro-intestinaux</i> Digestif Marga, Gelusil, Isudrine, Maalox, Moxydar, Phosphalugel, Rennie, Riopan, Rocgel, Xolaam, Actapulgate, Bedelix, Smecta, Bolinan, Poly-Karaya, Pepsane, Polysilane, Siligaz, Acidrine, Contracide, Gastropulgate, Gelox, Kaomuth, Mutésa, Neutroses, Gaviscon...

2. Etre au repos, sans boire, ni manger, ni fumer depuis **12 heures**, ni entre les 2 prélèvements

3. Le brossage des dents n'est pas une contre-indication.

* Toutefois, si vous devez continuer le traitement, le test INFAI peut être réalisé à condition d'ajouter un repas supplémentaire (REFEX) fourni sur simple demande par votre pharmacien.